

Le peeling mixte

POUR RAJEUNIR LES LÈVRES



PAR LE DOCTEUR **BÉATRICE ZAKARIAN**

Le traitement des rides de la lèvre ne peut être traité chirurgicalement. C'est une zone peu accessible et cela reste un dilemme si on veut éliminer de manière définitive ces rides du pourtour de la bouche qui gênent beaucoup de patientes aujourd'hui.

La demande de réparation de cette zone est croissante et de nombreuses techniques existent mais peuvent paraître insuffisantes. En effet, les techniques invasives de type laser peuvent présenter des risques de dépigmentation post acte et le comblement par acide hyaluronique permet de bons résultats pour les rides légères à moyenne mais doit être complété par d'autres techniques pour les rides plus profondes.

Le peeling mixte est ainsi une solution satisfaisante et rapide dans le traitement des rides péribuccales. Associant la combinaison du peeling électromécanique et d'un peeling chimique, le peeling mixte va offrir le relissage parfait et en toute sécurité. Un seul traitement va permettre d'obtenir un bon résultat qui sera durable. Le succès de cette technique réside dans l'utilisation d'un courant électrique paramétré. La réalisation de l'acte dure environ 30 minutes* pendant lequel la patiente bénéficie d'une anesthésie locale qui aura été pratiquée au préalable rendant le traitement indolore.

L'ACTE SE PRATIQUE EN DEUX TEMPS

Le premier temps est d'ordre mécanique, en effet, le médecin retire de manière sélective l'épiderme grâce à une électrode qui est reliée au dispositif médical électrique à haute fréquence qui génère une onde pulsée spécifique. Le derme reste absolument intact.

Le deuxième temps consiste à appliquer sur cette zone désépidermisée une solution de résorcine saturée dans de l'eau pendant 1 minute et 30 secondes. La patiente peut repartir ensuite sans pansement ni



Avant et après un peeling mixte

médication particulière. Une croûte va se former dans les jours suivants et se détachera spontanément sous 7 à 10 jours pour laisser apparaître une peau plus lissée. La rougeur présente de quelques jours à 6 semaines pourra être masquée par un maquillage couvrant. La zone traitée ne sera pas exposée au soleil durant 2 mois sans écran solaire préalable et ceci afin d'éviter les rebonds de pigmentation éventuels. Les avantages de cette méthode sont nombreux. La trame de la peau rajeunit, le résultat est stable, la patiente ne nécessite aucune médication et surtout la qualité de la peau reste naturelle. L'éviction sociale sera partielle d'une dizaine de jours. Ce traitement des rides profondes du pourtour péribuccal par le peeling mixte est une technique non invasive de choix pour le relissage parfait de la lèvre avec une uniformité de la texture de la peau. ■

* Acte réalisé avec le dispositif TIMED. Dispositif médical de classe IIB, marquage CE. Les actes réalisés à l'aide du dispositif Timed ne sont pas remboursés par les caisses d'assurance maladie mais certaines interventions peuvent être remboursées dans le cadre de l'acte. Il est nécessaire de se référer à la notice d'instruction livrée avec le produit avant toute utilisation.

